

L'A.I.D.S. vista da ... SUD

L'esperienza dell'Associazione Bhalobasa



Alessandro Cipriano - Firenze 1 Dicembre 2011





Bhalobasa: le nostre radici ...



I nostri progetti



- 1. Sostegno a Distanza**
- 2. Micro/Macro Progetti**
- 3. Viaggi**



I nostri progetti

Le zone calde della malnutrizione



- Paesi con oltre il 15% di malnutrizione acuta
- Paesi con oltre il 10% di malnutrizione acuta
- Paesi con oltre il 4% di malnutrizione acuta



I nostri progetti

Le zone calde della malnutrizione

- Paesi con oltre il 15% di malnutrizione acuta
- Paesi con oltre il 10% di malnutrizione acuta
- Paesi con oltre il 4% di malnutrizione acuta



Uganda



Dato Epidemiologico	UGANDA	Confronto ITALIA
Popolazione	30.884.000	57.364.000
Popolazione fra i 15 e 49 anni	13.370.000	27.475.000
Crescita annuale popolazione	3.6 %	0.1%
Popolazione urbana	13%	67.4%
Aspettativa di vita (anni)	50	79.7
Mortalità Infantile	7.8%	0.5
Mortalità sotto i 5 anni	13.4%	0.6
Spesa procapite per la salute	130 \$	2.204 \$




Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008


Uganda



Estimated adult HIV (15-49) prevalence %, 1990-2007




Number of people living with HIV, 1990-2007



Uganda



Estimated number of deaths due to AIDS 1990-2007



Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008

Uganda



Reported number of sites that are providing antiretroviral therapy

	2005	2007
Total	175	286

Source: UNAIDS/WHO, 2008

Estimated number of people receiving antiretroviral therapy

	2004	2005	2006	2007
Both sexes	44 000	75 000	96 000	115 000
Low estimate	53 000	71 000	91 000	110 000
High estimate	65 000	79 000	101 000	121 000

Source: UNAIDS/WHO, 2008

Estimated number of people needing antiretroviral therapy based on UNAIDS/WHO methodology

	2004	2005	2006	2007
Both sexes	370 000	360 000	360 000	350 000
Low estimate	290 000	290 000	290 000	290 000
High estimate	490 000	460 000	450 000	430 000


Source: UNAIDS/WHO, 2008



Uganda



Trends in antiretroviral therapy coverage 2004-2007



Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008

Uganda



Estimated percentage of pregnant women living with HIV who received antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission


	2004	2005	2006	2007
Total	9	15	25	34
Low estimate	8	13	22	29
High estimate	10	17	28	39

Source: UNAIDS/UNICEF/WHO, 2008



Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008

Uganda



Uganda



Uganda



Uganda



Uganda



Attività svolte:

- 1. Costruzione delle strutture del dormitorio**
- 2. Attivazione del Sostegno a Distanza**
- 3. Costruzione di sistemi di irrigazione, elettrificazione solare e purificazione delle acque**
- 4. Ristrutturazione del dispensario e formazione operatori**
- 5. Screening completo sieropositività**
- 6. Interventi terapeutici sui sieropositivi**
- 7. Lavoro di formazione/educazione grazie alla presenza del Servizio Civile Nazionale**

Uganda



Limiti:

- 1. Difficoltà di discussione sul tema con gli operatori**
- 2. Conseguente difficoltà di verifica e intervento terapeutico**
- 3. Conseguente difficoltà di prevenzione reale**



Uganda



Prospettive future

1. Intensificazione presenza in loco volontari
2. Presa in carico diretta della gestione dei controlli
3. Attivazione di presenze specializzate in sede

India



Dato Epidemiologico	INDIA	Confronto ITALIA
Popolazione	1.169.016.000	57.364.000
Popolazione fra i 15 e 49 anni	613.757.000	27.475.000
Crescita annuale popolazione	1.4 %	0.1%
Popolazione urbana	29%	67.4%
Aspettativa di vita (anni)	63	79.7
Mortalità Infantile	5.7%	0.5
Mortalità sotto i 5 anni	7.6%	0.6
Spesa procapite per la salute	100 \$	2.204 \$




Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008


India



Estimated adult HIV (15-49) prevalence %, 1990-2007



Number of people living with HIV, 1990-2007



India



Reported number of sites that are providing antiretroviral therapy

	2005	2007
Total		137

Source: UNAIDS/WHO, 2008



UNAIDS
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS



India



Estimated number of pregnant women living with HIV needing antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission based on UNAIDS/WHO methodology

	2004	2005	2006	2007
Total	79 000	74 000	69 000	64 000
Low estimate	62 000	54 000	45 000	37 000
High estimate	97 000	92 000	90 000	92 000

Source: UNAIDS/WHO, 2008


Estimated percentage of pregnant women living with HIV who received antiretrovirals for preventing mother-to-child transmission

	2004	2005	2006	2007
Total	5	3	10	14
Low estimate	4	2	8	10
High estimate	7	4	16	24

Source: UNAIDS/WHO, 2008



India



India



Contesto sociale:

1. Sistema Governativo non capillare e scarsamente significativo
2. Alta percentuale di popolazione tribale con bassissima *compliance* alla diagnosi e alle sue conseguenze
3. Alta incidenza di MTCT




India



Out reach services

Home Visits



India




India



India



Bed Utilization



India



Burkina Faso



Dato Epidemiologico	BURKINA	Confronto ITALIA
Popolazione	14.784.000	57.364.000
Popolazione fra i 15 e 49 anni	6.840.000	27.475.000
Crescita annuale popolazione	2.9 %	0.1%
Popolazione urbana	19%	67.4%
Aspettativa di vita (anni)	47	79.7
Mortalità Infantile	12.2%	0.5
Mortalità sotto i 5 anni	20.4%	0.6
Spesa procapite per la salute	86 \$	2.204 \$




Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008


Burkina Faso



Estimated adult HIV (15-49) prevalence %, 1990-2007




Number of people living with HIV, 1990-2007



Burkina Faso



Estimated number of deaths due to AIDS 1990-2007



Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008

Burkina Faso



Reported number of sites that are providing antiretroviral therapy

	2005	2007
Total	44	76

Source: UNAIDS/WHO, 2008

Estimated number of people receiving antiretroviral therapy

	2004	2005	2006	2007
Both sexes	3 000	8 200	14 000	17 000
Low estimate	3 000	7 500	13 000	15 000
High estimate	3 500	9 000	15 000	19 000

Source: UNAIDS/WHO, 2008

Estimated number of people needing antiretroviral therapy based on UNAIDS/WHO methodology


	2004	2005	2006	2007
Both sexes	42 000	43 000	45 000	48 000
Low estimate	30 000	33 000	36 000	39 000
High estimate	53 000	54 000	56 000	58 000



Burkina Faso



Trends in antiretroviral therapy coverage 2004-2007



Fonte WHO- UNICEF - UNAIDS Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS 2008

Burkina Faso



Seminario in 4 nazioni nel 2007
(Senegal, Burkina Faso, Tanzania e Sud Africa)

Ritardi nel
decentramento
dei Servizi

Mancanza di
Personale
Qualificato

Insufficiente
Sostegno a
Associazioni
Locali


Situazione
HIV-AIDS
Paesi Africani
Coinvolti

Counselling
Inefficace

Mancanza di
Figure non
Sanitarie

Mancanza di
Sostegno ai
Bisogni
Secondari

Burkina Faso



Burkina Faso



Obiettivo Primario identificato:

PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE MATERNO INFANTILE

**Situazione di
particolare
predisposizione
all'aiuto**

**Coinvolgimento
indiretto del
nucleo familiare**

**Ruolo della
donna nella
comunità di
origine**

PIR AIDS 2010 – Regione Toscana

1° Fase: organizzazione di un sistema efficiente di gestione dei registri e di raccolta dei dati

- 1. Fornire strumenti alle strutture locali**
- 2. Moduli di formazione del personale locale**



PIR AIDS 2010 – Regione Toscana

2° Fase: formazione dei dirigenti e del personale delle associazioni e delle istituzioni della società civile

- 1. Formare sui servizi esistenti**
- 2. Sulle modalità di accesso ai servizi**
- 3. Sulle risorse disponibili**



PIR AIDS 2010 – Regione Toscana

3° Fase: formazione delle comunità locali

- 1. Giornate di informazione e sensibilizzazione**
- 2. Utilizzo di strumenti come rappresentazione teatrali**
- 3. Consegna di gadget, etc.**



PIR AIDS 2010 – Regione Toscana

4° Fase: implementazione dei servizi di supporto alimentare e sostegno psicosociale

- 1. Copertura dei costi di trasporto**
- 2. Supporto alimentare**
- 3. Etc.**



PIR AIDS 2010 – Regione Toscana

5° Fase: seminario finale in Italia



L'A.I.D.S. vista da ... SUD

L'esperienza dell'Associazione Bhalobasa



Alessandro Cipriano - Firenze 1 Dicembre 2011